

FVG_DISERBO Soia 2026 v2

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Pre semina	Dicotiledoni	Pyraflufen ethyl	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	In alternativa tra pre semina e pre emergenza						
	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate		Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.	Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di Amaranthus resistenti agli erbicidi ALS				
		Acido pelargonico		Diserbo letti di semina						
Pre emergenza	Dicotiledoni	Pyraflufen ethyl		In alternativa tra pre semina e pre emergenza						
	Graminacee e Dicotiledoni	Pethoxamide								
		Pendimethalin				Il Pendimetalin ha una buona azione su Polygonum aviculare				
		Aclonifen		Impiego localizzato sulla fila di semina o ad anni alterni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.						
		Clomazone			Il clomazone risulta attivo nei confronti dell'Abutilon					
		Bifenox		Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.						
		Metobromuron								
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Bifenox	Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.							
		Clomazone								
	Dicotiledoni	Bentazone	Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su sorgo o soia.		In caso di dominanza di Chenopodium e Abutilon					
		Tifensulfuron metile		Il Tifensulfuron in associazione all'Imazamox permette un miglior controllo del Chenopodium.						

Post emergenza		Imazamox			È preferibile che i graminici non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonici.		
	Graminacee	Ciclossidim					
		Clethodim					
		Fluazifop-p-butile					
		Propaquizafop					
		Quizalofop-p-etile					