FVG_DISERBO ARBOREE Actinidia 2026 v1										
Impianto Attività	**Infestante**	**Sostanza attiva**	**Num. max inter. con i c.a.s**	**Note sostanza attiva - vincoli**	**Note sostanza attiva - consigli**	**Note attività - vincoli**	**Note attività - consigli**	**Vincoli coltura**	**Consigli coltura**	**Informazioni aggiuntive**
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE **Fogliare (post emergenza infestanti)**	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico	**0** Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi					Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo/spollonatura deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura. Tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio non vale per i prodotti impiegati come spollonanti.	Interventi chimici: consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando : - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.	
		Glifosate		Max 9 l/ha/anno (superficie diserbata) con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno (superficie diserbata) se si usano anche erbicidi residuali in produzione						
	Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen ethyl								
		Carfentrazone ethyle		Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante						
	Graminacee	Fluazifop-p-butile								
		Clethodim								
	Polloni	Acido pelargonico								
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE **Residuale**	Dicotiledoni e Graminacee	Clomazone								