

FVG_DISERBO ARBOREE Olivo 2026 v2												
Impianto Attività	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive		
ALLEVAMENTO (FINO A 3 ANNI) Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Max 9 l/ha/anno (superficie diserbata) con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; Max 6 l/ha/anno (superficie diserbata) se si usano erbicidi residuali in produzione.				Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura. Tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio non vale per i prodotti come spollonanti.	- Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno; - Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità; - Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale; - L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%); - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.			
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Clomazone										
		Diflufenican										
		Flazasulfuron										
		Florasulam		Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre								
		Iodosulfuron metil-sodium										
		Oxifluorfen										
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	2,4 D										
		Glifosate		Max 9 l/ha/anno (superficie diserbata) con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; Max 6 l/ha/anno (superficie diserbata) se si usano erbicidi residuali in produzione.								
		Flazasulfuron										
		Iodosulfuron metil-sodium										
	Dicotiledoni	Fluroxipyr										
		Halauxifen-metile										
	Dicotiledoni e polloni	Acido pelargonico										
		Carfentrazone ethyle	Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come spollonante.									
		Fluroxipyr										
		Glifosate + 2,4 D										
Graminacee	Pyraflufen ethyl											
	Clethodim											
PRODUZIONE Residuale (pre emergenza)	Dicotiledoni	Fluazifop-p-butile										
		Tribenuron metile										