

FVG_DISERBO_Girasole da seme_2026_v1

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con l c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	3 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	<p>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree</p> <p>Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.</p> <p>Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.</p> <p>Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</p>	<p>Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.</p>				
		Acido pelargonico							
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen		<p>Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.</p>					
		Oxifluorfen							
		Pendimethalin							
		Metobromuron							
		Acido pelargonico							
		Diflufenican							
Prosulfocarb									
Post emergenza	Graminacee	Fluazifop-p-butile		<p>Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.</p>					
		Ciclossidim							
		Clethodim							
		Propaquizafop							
		Quizalofop-p-etile							
	Dicotiledoni	Aclonifen							

		Tribenuron metile	Impiegabile solo su cv resistenti.	Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.			
		Tifensulfuron metile	Impiegabile solo su cv resistenti.	Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.			
		Halauxifen-metile					
	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox	Impiegabile solo su cv resistenti.	Fare attenzione allo sviluppo di resistenze.			