

FVG_DISERBO_Soia da seme_2026_v1

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	2	Diserbo letti di semina	<p>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree</p> <p>Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.</p> <p>Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.</p> <p>Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</p>				
		Glifosate							
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pethoxamide	<p>Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi</p>		<p>Il Pendimetalin ha una buona azione su Polygonum aviculare</p> <p>Impiego localizzato sulla fila di semina o ad anni alterni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.</p> <p>Il Clomazone risulta attivo nei confronti dell'Abutilon.</p> <p>Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.</p>	<p>Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di Amaranthus resistenti agli erbicidi ALS</p>			
		Pendimethalin							
		Aclonifen							
		Clomazone							
		Bifenox							
		Metobromuron							
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone	2		<p>Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.</p>				
		Bifenox							

Post emergenza	Dicotiledoni	Bentazone	Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su sorgo o soia. In caso di dominanza di Chenopodium e Abutilon	È preferibile che i gramincidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonici.			
		Tifensulfuron metile	Il Tifensulfuron in associazione all'Imazamox permette un miglior controllo del Chenopodium.				
		Imazamox	In caso di dominanza di Solanum e Abutilon				
	Graminacee	Ciclossidim					
		Quizalofop-p-etile					
		Propaquizafop					
		Clethodim					